

## روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم

### دانش آموzan متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

یحیی احمدی<sup>۱</sup>، مهدی عبدالکریمی<sup>۲</sup>، احمد رضا صیادی<sup>۳</sup>، محمد اسدپور<sup>\*</sup><sup>۴</sup>

- دانشجوی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران - استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران - استادیار، گروه روان پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران - استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

### خلاصه

**مقدمه:** سبک زندگی در انجام رفتارهای سالم توسط دانش آموzan به عنوان بخش مهمی از یک جامعه نقش مهمی دارد. وسایل اندازه گیری که برای تعیین میزان دستیابی به اهداف پژوهشی در هر مطالعه ای مورد استفاده قرار می گیرند، نیاز به ارزشیابی دارند. این مطالعه باهدف تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم در دانش آموzan مقطع متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده صورت گرفته است...

**روش کار:** در مطالعه روان سنجی حاضر پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پژوهش های انجام شده در شهر رفسنجان، پرسشنامه اولیه طراحی شد. جهت تعیین روایی ابزار به روش روایی صوری و محتوا با استفاده از نظرات ۱۰ نفر از دانش آموzan متوسطه اول و ۱۰ نفر از متخصصان آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی کمک گرفته شد و تعیین پایایی ابزار با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت.

**نتایج:** در روایی کمی، ضریب تأثیر همه گویه ها تا بیشتر از ۱/۵ بود. نسبت روایی بین ۰/۶۲ و ۱ بود و شاخص روایی محتوا هر بخش از ۰/۷۹ بیشتر بود که کلیه مقیاس تا قابل قبول بودند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که به ترتیب برای سازه های آگاهی، (۰/۷۴)، هنجارهای ذهنی (۰/۷۰)، نگرش (۰/۰)، کنترل رفتاری درک شده (۰/۸۵)، قصد رفتاری (۰/۸۵) و رفتار (۰/۰) برآورد گردید.

**نتیجه گیری:** یافته تا نشان داد که پرسشنامه سبک زندگی دانش آموzan بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده دارای روایی و پایایی مفید و قابل قبول است و می تواند مورد استفاده پژوهشگران ایرانی قرار گیرد...

**کلیدواژه‌گان:** پرسشنامه سبک زندگی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانش آموzan، روایی پایایی

\*نویسنده مسئول: محمد اسدپور [Asadpour2011@gmail.com](mailto:Asadpour2011@gmail.com)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۵/۱۰/۲۱

نمبر: ۰۹۱۷۳۶۵۶۴۵۰

تلفن: ۰۷۶۴۲۸۷۵۹۶

ططفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید

احمدی، عبدالکریمی ع، احمد رضا ص، اسدپور م. روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم دانش آموzan متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، شماره یک، تابستان ۱۳۹۸؛ ۱(۶): ۶۷-۱۵۷

## مقدمه

با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته در کشور ایران، سبک زندگی جوانان و نوجوانان از وضعیت مطلوبی بر خوردار نیست (۹). نظریه‌های متعددی ممکن است در گیری فرد را در اتخاذ یک رفتار جدید توضیح دهند. نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، علاوه بر توجه به نگرش افراد به بررسی باورهای ذهنی آنها نیز می‌پردازد و از محدود نظریه‌هایی است که به فاکتورهای اجتماعی در ایجاد رفتار، توجه خاصی نشان می‌دهد (۱۰). تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده یکی از کامل‌ترین و مناسب‌ترین تئوری‌ها برای مطالعه رفتار است. اساس این تئوری توسط آجزن و فیش بین در سال ۱۹۸۷ برای پیشگویی و توضیح رفتار فرد مطرح شد. این تئوری و فرد را به عنوان یک عمل‌کننده منطقی فرض می‌کند؛ به طوری که فرد قبل از انجام یک رفتار به پردازش اطلاعات می‌پردازد و ممکن است که باورهای بنیادی فرد و درنتیجه رفتار او تغییر کند (۱۱). اولین ساختار این تئوری، رفتار است و تعریف و اندازه‌گیری صحیح آن بسیار مهم است و رفتار می‌بایست در قالب هدف، بافت و زمان انجام آن تعریف شود. دومین ساختار این تئوری قصد رفتاری است که قوی‌ترین تعیین‌کننده رفتار است؛ و به صورت اندیشه فرد برای انجام یک رفتار در آینده نزدیک تعریف می‌شود. این قصد تحت تأثیر سه عامل (۱) نگرش نسبت به رفتار، (۲) هنجارهای ذهنی ۳ کنترل رفتاری درک شده از نظر آسانی و سختی انجام کار است (۱۲) نگرش نسبت به رفتار؛ ارزشیابی مثبت یا منفی در مورد انجام یک رفتار می‌باشد که از دو زیر سازه باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج رفتار که باعث حصول نگرش نسبت به رفتاری شود، تشکیل شده است (۱۳) هنجارهای ذهنی، فشارهای اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد (۱۴) کنترل رفتاری درک شده؛ که عبارت است از درجه‌ای از احساس فرد در مورد این که انجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت انجام رفتار هدف است؛ رفتار نیز همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است. این تئوری رفتار، منحصرأ تحت کنترل قصد رفتاری می‌باشد (۱۵). یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر یک از برنامه‌های آموزش بهداشت ارزشیابی و چگونگی انجام آن است. جهت جمع‌آوری اطلاعات دقیق و با حداقل خطأ و در راستای اهداف پژوهش نیاز است تا وسایل اندازه‌گیری مورد ارزشیابی قرار گیرند و برای کاهش خطاهای اندازه‌گیری، اقداماتی کلی مانند طراحی یک ابزار خوب و استاندارد کردن آن صورت پذیرد (۱۶).

نوجوانی دوران منحصر به فردی در زندگی است و یکی از پر چالش‌ترین دوره‌های رشد انسان به شمار می‌آید؛ در این دوران، نوجوانان را در معرض خطر گسترش رفتارهای پر خطر بهداشتی قرار می‌دهد، رفتارهایی مثل سیگار کشیدن، کاهش فعالیت جسمانی و تنفسی نامناسب که می‌تواند در آینده منجر به بیماری‌های مزمن گردد (۱). دانش آموزان امروزی بیش از نوجوانان نسل‌های گذشته مرتكب رفتارهای ناسالم بهداشتی می‌شوند. بسیاری از عادات زندگی فرد طی نوجوانی شکل گرفته و در دوره‌های بعدی زندگی نیز تداوم می‌یابند (۲). آمار ارائه شده در مورد دلایل اصلی مرگ میر بیانگر آن است که ۵۳ درصد از علل مرگ‌ومیر مربوط به شیوه زندگی، ۲۱ درصد به عوامل محیطی، ۱۶ درصد به عامل ارث و ۱۰ درصد به سیستم ارائه خدمات بهداشتی مربوط می‌شود (۳). کشور ایران با بیش از ۱۵ میلیون جمعیت نوجوان یکی از جوان‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌گردد این نوجوانان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و در شکل گرفتن نسل آینده و ارتقای سلامت جامعه بسیار مهم هستند و تأمین سلامت آنان از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی است (۴). سبک زندگی در انجام رفتارهای سالم در میان دانش آموزان و محیط مدرسه به عنوان محیط یادگیری و تغییر رفتار و درنهایت ایجاد یک جامعه سالم اهمیت دارد (۵). یکی از اهداف تعیین شده سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۲۰، ارتقای سبک زندگی سالم در افراد جامعه است، بر این اساس، کشورها می‌بایست راهبردهایی را که در بهبود زندگی فردی و اجتماعی مؤثرند، در دستور کار خود قرار دهند و عواملی مانند فعالیت فیزیکی نامناسب، تنفسیه نامطبوب و سوءصرف مواد را که سبک زندگی سالم را خدشه‌دار می‌کنند را کاهش دهند (۶). بیش از یک‌سوم موارد مرگ‌ومیر در دنیا مربوط به رژیم غذایی نامناسب، فعالیت بدنسی کم، استعمال سیگار است (۷) بسیاری از مشکلات بهداشتی از قبیل چاقی، بیماری‌های قلب و عروق، انواع سرطان و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به چشم می‌خورد با دگرگونی‌های سبک زندگی افراد آن جامعه ارتباط دارد (۸).

به عنوان مثال در گویه ۷ آگاهی که سؤال شده میزان موردنیاز بدن برای گروه نان و غلات چقدر است؟ کلمه میزان در سؤال و کلمه واحد بکار برده شده در گزینه‌های تستی برای بعضی از داش آموzan قابل فهم نبود برای درک بیشتر آن هم به صورت شفاهی تعریف آنها برای داش آموzan توضیح داده شد و هم در پایین پرسشنامه تعریف این کلمات آورده شد. جهت کاهش و حذف عبارات نامناسب و تعیین اهمیت هریک از عبارت تا از روش کمی ضریب تأثیر استفاده شد. بر این اساس برای هر یک از ۶۶ گویه ابزار، در جداولی به صورت طیف لیکرتی ۵ قسمتی (کاملاً مهم است، مهم است، به طور متوسط مهم است، اندکی مهم است و اصلاً مهم نیست) طراحی شد. نمره گذاری این طیف از امتیاز ۱ برای اصلاً مهم نیست تا امتیاز ۵ برای کاملاً مهم است تعیین گردید. با مراجعته به یکی از مدارس متوسطه اول شهر رفسنجان با در اختیار گذاشتن ۱۰ نفر از داش آموzan گرفته شد و با در اختیار گذاشتن پرسشنامه نظرات ۱۰ نفر از متخصص آن هم گرفته شد، نظرات هر دو گروه پس از تکمیل جهت تعیین روایی نمره گذاری شد و با استفاده از فرمول روش ضریب تأثیر، روایی صوری محاسبه گردید.

(میانگین نمره اهمیت × درصد فراوانی = ضریب تأثیر)

در صورتی که نمره تأثیر از ۱/۵ بیشتر شود گویه تا برای تجزیه و تحلیل بعدی مناسب تشخیص داده شده و حفظ خواهد شد (۱۷).

جهت تعیین روایی محتوا از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. برای تعیین روایی کمی از دو شاخص نسبت روایی محتوا<sup>۲</sup> و شاخص روایی محتوا<sup>۳</sup> تعیین شده توسط لاوشه<sup>۴</sup> (Lawshe's technique) استفاده گردید بر این اساس پرسشنامه در اختیار ۱۰ نفر از گروه متخصصان که تعدادی از اساتید آموزش بهداشت و اپیدمیولوژیست بودند قرار گرفت. برای تعیین نسبت روایی محتوا از آنها درخواست شد که در خصوص ضرورت هر یک از گویه تا با استفاده از گزینه‌های ضروری است، مفید اما ضروری نیست" و "ضرورتی ندارد"، پاسخ دهند. و سپس

ممکن است ابزارهای موجود که معتبر و پایا باشند، اندک باشند. لذا این مطالعه باهدف تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم داش آموzan بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده انجام شد.

### روش کار

این مطالعه باهدف بررسی خصوصیات روان‌سنجدی پرسشنامه سبک زندگی در داش آموzan متوسطه اول است که پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از پژوهش‌های انجام‌شده، پرسشنامه اولیه مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر اساس توصیه‌های آجزن<sup>۱</sup> طراحی شد. جهت تعیین روایی ابزار به روش روایی صوری و محتوا با استفاده از نظرت ۱۰ نفر از داش آموzan متوسطه اول و ۱۰ نفر از متخصصان آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی کمک گرفته شد تعیین پایایی ابزار با استفاده از روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت. برای طراحی ابزار، اصولی که در جمع‌آوری داده تا نیاز است از قبیل کد پرسشنامه، نام مدرسه، مؤسسه اجراکننده پژوهش، بدون نام بودن پرسشنامه، مجرمانه بودن اطلاعات و سایر نکات اخلاقی در نظر گرفته شد. ابزار موردنظر در قالب ۶۶ گویه و در چهار قسمت طراحی شد. قسمت اول شامل ۷ سؤال مرتبط با ویژگی‌های جمیعت شناختی داش آموzan: سن، مقطع تحصیلی، سطح تحصیلات والدین، شغل والدین و درآمد خانواده، قسمت دوم، شامل سؤالات مرتبط سنجش آگاهی داش آموzan درزمینه سبک زندگی سالم (۱۱ سؤال)، بود. قسمت سوم، شامل سؤالات مرتبط با ابعاد مختلف تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده شامل نگرش (۱۷ سؤال)، هنجارهای انتزاعی (۹ سؤال)، کنترل رفتار درک شده (۱۳ سؤال) و قصد رفتاری (۷ سؤال) بود. درنهایت قسمت چهارم، مربوط به سؤالات رفتار داش آموzan درزمینه سبک زندگی سالم (۹ سؤال) و شامل فعالیت‌های بدنی، تعذیه سالم، استعمال دخانیات، بود.

برای تعیین روایی صوری، از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. در روش کیفی، مصاحبه‌هایی با ۱۰ نفر از داش آموzan برای تأمین اعتبار ظاهری و یافتن سطح دشواری درک عبارات و کلمات گویه تا صورت گرفت و نظرات آنان اعمال گردید.

<sup>1</sup> Ajzen

<sup>2</sup> Content Validity Ratio

<sup>3</sup> Content Validity Index

<sup>4</sup> Lawshe's technique

تعیین "مناسب یا ضروری بودن" گویه مورد مقایسه قرار

از دانش آموزان مقطع متوسطه اول تکمیل شد تجزیه و تحلیل داده تا با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های آگاهی (۰/۷۴)، نگرش (۰/۷۰)، هنجارهای انتزاعی (۰/۷۳)، کنترل رفتار درک شده (۰/۸۵) و قصد رفتاری (۰/۸۵) و رفتار (۰/۷۰) تعیین شد. آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که صفر به مفهوم آن است که عبارات یا سؤالات یک مقیاس هیچ ربطی به یکدیگر ندارند و یک به مفهوم همبستگی کامل است. مطابق این روش ابزار موردنظر زمانی از پایایی مناسب برخوردار خواهد بود که ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر یا مساوی ۰/۷ باشد (۱۹).

## نتایج

در مرحله روایی سنجی، روایی صوری ابزار با نظر دانش آموزان، در بعد کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از انجام تغییرات جزئی و اصلاحات موردنظر دانش آموزان، ضریب تأثیر هریک از سؤالات محاسبه شد. نمره کسب شده کلیه سؤالات بیشتر از ۱/۵ بود و سؤالات قابل قبول بودند. نسبت روایی محتوا برای هریک از سؤالات سازه های رفتار برنامه ریزی شده (آگاهی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و رفتار) توسط پانل متخصصان محاسبه شد. طبق مقادیر جدول لاؤشه، حداقل نسبت روایی برای تعداد ۱۰ نفر متخصص ۰/۶۲ است.

در این مطالعه فقط دو سؤال، یک سؤال مربوط به سازه نگرش و یک سؤال مربوط به سازه کنترل رفتاری درک شده به دلیل عدم کسب نمره شاخص روایی محتوا قابل قبول حذف شدند، بقیه سؤالات قابل قبول بودند از نظر شاخص روایی محتوا در سه بخش مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن، میانگین نمرات هر بخش در تمامی گویه تا از ۰/۷۹ بیشتر و قابل قبول ارزیابی شد (جدول ۱).

نسبت روایی محتوا، محاسبه گردید و با جدول لاؤشه برای گرفت. بر اساس جدول لاؤشه حداقل نسبت روایی

محاسبه گردید و با جدول لاؤشه برای تعیین "مناسب یا یا ضروری بودن" گویه مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس جدول لاؤشه حداقل نسبت روایی محتوا لازم برای ۱۰ نفر متخصص (۰/۶۲) است. و نظر متخصصان به کمک فرمولی که تعیین نسبت روایی محتوا استفاده می شود محاسبه گردید.

$$CVR = \frac{n_E - \frac{N}{2}}{\frac{N}{2}}$$

وجود گویه موردنظر را ضروری می دانند.

N: تعداد کل افراد متخصصی که گویه موردنظر را ارزیابی کرده اند.

در فرمول فوق اگر بیش از نیمی از متخصصین بیان کنند که آن گویه ضروری یا سودمند است، از مقداری اعتبار محتوا برخوردار است (۱۸). جهت تعیین شاخص روایی محتوا، در اختیار پانل متخصصان قرار گرفت تا در مورد گویه تا از نظر سه معیار "مریبو" یا اختصاصی بودن (<sup>۵</sup>"Relevancy") "سادگی" و روان بودن<sup>۶</sup> ("Simplicity") "وضوح یا شفاف بودن"<sup>۷</sup> ("Clarity") در

تعداد ارزیابانی که به آیتم نمره سه و چهار داده اند  
تعداد کل ارزیابان

طیف لیکرتی چهار قسمتی اظهارنظر کنند و درنهایت مقدار آن طبق فرمول موجود محاسبه شد.

نمره محاسبه شده شاخص روایی محتوا عددی بین ۰ تا ۱ است. پذیرش گویه بر اساس این معیار است که نمره بالاتر از ۰/۷۹ مناسب، نمره بین ۰/۷۹ تا ۰/۷۰ سؤال برانگیز بوده و به اصلاح و بازنگری نیاز دارد و نمره کمتر از ۰/۷۰ غیرقابل قبول بوده و بایستی حذف گردد (۱۷، ۱۸) جهت تعیین پایایی ابزار، از روش محاسبه همسانی درونی آلفای کرونباخ برای مقیاس های آگاهی، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و رفتار استفاده شد و در یک نوبت و توسط ۲۰ نفر

<sup>5</sup> Relevancy

<sup>6</sup> Simplicity

<sup>7</sup> Clarity

## یحیی احمدی و همکاران / روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم

جدول ۱ - روایی صوری و محتوایی مربوط به مقیاس‌های سبک زندگی سالم در دانش آموزان بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

شاخص‌های روایی محتوا						نسبت روایی محتوا	شاخص ضریب تأثیر	سوالات
از پیشیگیری	C-CVI	وضعی	S-CVI	R-CVI	از پیشیگیری	CVR	از پیشیگیری	نماینده
								آگاهی
قبول	۰/۹	۰/۹	۱	قابل	۱	قابل	۴/۵	میزان فعالیت بدنی توصیه شده برای سن شما چقدر است
قبول	۰/۸	۰/۹	۱	قابل	۱	قابل	۴/۵	منظور از فعالیت بدنی باشد متوجه، چیست؟
قبول	۰/۹	۰/۹	۱	قابل	۱	قابل	۳/۷	منظور از فعالیت بدنی شدید، چیست؟
قبول	۰/۷	۰/۹	۰/۹	قابل	۰/۸	قابل	۴	چند درصد از موارد سرطان ریه ناشی از سیگار است
قبول	۰/۶	۱	۱	قابل	۱	قابل	۳/۵	کدامیک در مورد سیگار صحیح است
قبول	۰/۶	۰/۸	۱	قابل	۰/۸	قابل	۳/۸	علت افزودن طعم به تنباکو چیست
قبول	۰/۹	۱	۱	قابل	۱	قابل	۴/۸	کدامیک در مورد قلیان صحیح است
قبول	۰/۸	۰/۹	۱	قابل	۰/۸	قابل	۴/۵	کدامیک در مورد مصرف سیگار صحیح است
قبول	۰/۸	۰/۹	۱	قابل	۱	قابل	۳/۶	میزان موردنیاز روزانه بدن برای گروه نان و غلات چقدر است
قبول	۰/۸	۰/۹	۱	قابل	۱	قابل	۴/۴	میزان موردنیاز روزانه بدن برای گروه سبزیجات چقدر است
قبول	۰/۷	۰/۹	۱	قابل	۱	قابل	۳/۴	میزان موردنیاز روزانه بدن برای گروه شیر و لبنیات چقدر است
نگرش								
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قابل	۰/۸	قابل	۴/۸	من اعتقاد دارم انجام فعالیت جسمانی باعث افزایش نشاط و شادابی می‌شود.
قبول	۱	۱	۱	قابل	۱	قابل	۴/۵	من اعتقاد دارم اگر منظم فعالیت جسمانی نداشته باشم ممکن است بیمار شوم.
قبول	۰/۹	۱	۱	قابل	۱	قابل	۲/۴	انجام فعالیت بدنی منظم احتمال موفقیت من در درس‌هایم را بیشتر می‌کند
رد	۰/۴	۰/۴	۰/۵	رد	۰/۴۷	قابل	۲/۵	فعالیت جسمانی مختص افراد دارای وقت آزاد است.
قبول	۰/۹	۱	۱	قابل	۱	قابل	۴/۸	انجام فعالیت بدنی منظم باعث کاهش استرس من خواهد شد
قبول	۰/۹	۱	۱	قابل	۱	قابل	۴/۴	انجام فعالیت جسمانی فقط مختص افراد چاق است.
قبول	۰/۹	۱	۱	قابل	۱	قابل	۳/۳	ورزش کردن فرصت مطالعه من را کم می‌کند

## یحیی احمدی و همکاران / روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالم

قبول	۰/۹	۱	۱	قبول	۱	قبول	۳/۴	کشیدن سیگار باعث کنترل عصبانیت می شود.
قبول	۱	۱	۱	قبول	۰/۸	قبول	۳/۴	صرف سیگار شروعی برای اعتیاد است
قبول	۰/۹	۱	۱	قبول	۰/۸	قبول	۳/۵	صرف سیگار به انسان احساس بزرگ شدن می دهد
قبول	۱	۱	۱	قبول	۰/۸	قبول	۳/۴	صرف سیگار باعث افزایش تمرکز در یادگیری می شود
قبول	۰/۹	۰/۹	۱	قبول	۰/۸	قبول	۲/۸	افرادی که قلیان مصرف می کنند دنبال خودنمایی هستند
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۲/۸	صرف قلیان به صورت تفریحی اعتیاد آور نیست
قبول	۰/۹	۰/۹	۱	قبول	۱	قبول	۴/۲	صرف مواد غذایی کم چرب فقط مخصوص بیماران قلبی و افراد مسن است.
قبول	۱	۱	۱	قبول	۱	قبول	۲/۹	صرف فست فود (ساندویچ، پیتزا...) از نظر من بسیار لذتبخش است
قبول	۱	۱	۱	قبول	۰/۸	قبول	۳/۴	خوردن فست فود (ساندویچ، پیتزا...) نشان دهنده کلاس اجتماعی بالاتر است
	۰/۹	۰/۹	۱		۱	قبول	۴/۲	خوردن مرتب انواع سبزی و میوه تا مخصوص افراد چاق است
								هنگارهای ذهنی
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۳	خانواده من به مصرف میوه و سبزی اهمیت خاصی می دهند
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۹	نظر خانواده من در مورد اهمیت مصرف میوه و سبزی برای من اهمیت زیادی دارد
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۸	من به رژیم غذایی توصیه شده توسط متخصصان برای من خودم اعتقاد دارم
قبول	۰/۸	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۲/۴	ارائه فست فود در مدرسه جهت ترغیب من در استفاده از آن اهمیت زیادی دارد
قبول	۰/۸	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۹	در بین خانواده و دوستان مصرف قلیان از سیگار کشیدن زشتی کمتری دارد
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۵	از نظر خانواده من مصرف سیگار شروعی برای مصرف مواد مخدر است
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۹	قبول	۳/۶	از نظر دوستان بسیاری از انسان های موفق سیگار هم می کشند
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۵	به نظر خانواده من ورزش کردن می تواند در رشد و سلامتی من تأثیر زیادی بگذارد
قبول	۰/۷	۰/۸	۰/۸	قبول	۰/۸	قبول	۴/۶	در مدرسه به ساعت ورزش به علت تأثیر آن بر سلامت اهمیت زیادی داده می شود
								کنترل رفتاری در ک شده
								برای من انجام حداقل ۳۰-۶۰ دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط ۵ روز در هفته آسان است.
قبول	۰/۸	۰/۸	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۲	من برنامه زمانی مشخصی برای انجام فعالیت جسمانی در طول هفته دارم.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۲	برای من یافتن مکانی مشخصی را برای انجام فعالیت جسمانی امکان پذیر می باشد.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۳	من می توانم نظر والدین خود را برای انجام ورزش و فعالیت جسمانی جلب کنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۵	من توانایی را دارم که از امکانات و تجهیزات ورزشی موجود در محله ام استفاده کنم.
رد	۰/۴	۰/۵	۰/۴	رد	۰/۵۱	قبول	۲/۳	می دانم یکی از موانع داشتن الگوی غذایی سالم، پایین بودن اطلاعات بهداشتی است.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۷	من این توانایی را دارم که میزان مواد غذایی توصیه شده روزانه را استفاده کنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۵	اینکه از فست فود و نوشابه کمتر استفاده کنم کاملاً تحت کنترل خودم می باشد
قبول	۰/۸	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۲	من این اطمینان را دارم که می توانم خانواده را برای اصلاح رژیم غذایی توجیه کنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۴	من این توانایی را در خود می بینم که حتی به مصرف سیگار و قلیان فکر هم نکنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۷	عدم هم نشینی با افرادی که سیگار استفاده می کنند کاملاً تحت کنترل من می باشد
قبول	۰/۷	۰/۸	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۸	من این توانایی را دارم که به توصیه برای مصرف سیگار یا قلیان نه بگویم
قبول	۰/۸	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۴	ترک محله ای که در آنجا قلیان یا سیگار استفاده می شود کاملاً تحت کنترل خودم است
								قصد رفتاری

## یحیی احمدی و همکاران / روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری سبک زندگی سالیم

قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۵	من تصمیم دارم که در روز حداقل ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ورزش متوسط داشته باشم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۲	من تصمیم دارم که از فست فود و نوشابه تا حد امکان استفاده نکنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۷	من تصمیم دارم که میزان میوه و سبزی توصیه شده را هر روز استفاده کنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۲	من تصمیم دارم که میزان لبنتیات توصیه شده را هر روز استفاده کنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۷	من تصمیم دارم که هیچ گاه قلیان مصرف نکنم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۷	من تصمیم گرفتم هیچ گاه حتی به مصرف سیگار فکر هم نکنم
قبول	۰/۸	۰/۹	۰/۸	قبول	۰/۸	قبول	۴/۵	من تصمیم گرفتم که اگر گاهی از سیگار یا قلیان استفاده می کرم آن را ترک کنم
								رفتار
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۴	من در ماه گذشته حداقل در هر روز ۲۰ تا ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید داشتم.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۶	من در طول ماه گذشته کمتر از دو بار در هفته از نوشابه های گازدار استفاده کرده ام
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۳	من در طول ماه گذشته سیگار کشیده ام.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۴	من در طول ماه گذشته از قلیان استفاده کرده ام.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۷	من در طول ماه گذشته روزانه سه بار میوه و سبزی مصرف کرده ام
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴	من در طول ماه گذشته هر روز حداقل دو بار از گروه لبنتیات استفاده کردم
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۹	من در ماه گذشته هر روز حداقل یک عدد تخم مرغ در رژیم غذایی خود مصرف کردم.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۳/۷	من در طول ماه گذشته از فست فود به عنوان و عده غذایی استفاده کردم.
قبول	۰/۹	۰/۹	۰/۹	قبول	۰/۸	قبول	۴/۶	من در ماه گذشته موقعیت هایی که در آن سیگار یا قلیان استفاده می شده را ترک کرده ام

در مرحله پایایی ابزار، پرسشنامه توسط ۲۰ نفر از دانش آموزان تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ آنها محاسبه شد (جدول ۲).

جدول ۲- پایایی مربوط مقیاس های سبک زندگی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده

ردیف	مقیاس	تعداد سؤال	ضریب الفی کرونباخ
۱	مقیاس سنجش آگاهی	۱۱	۰/۷۴
۲	مقیاس سنجش نگرش	۱۶	۰/۷۰
۳	مقیاس سنجش هنجارهای ذهنی	۹	۰/۷۳
۴	مقیاس سنجش کنترل رفتاری در ک شده	۱۲	۰/۸۵
۵	مقیاس سنجش قصد رفتاری	۷	۰/۸۵
۶	مقیاس سنجش رفتار	۹	۰/۷۰

بزرگ سال و جوانان برمی گردد و به رفتار نوجوانان چندان توجه خاصی نشده است (۲۱). با این وجود مطالعات محدودی به بررسی رفتارهای سبک زندگی در دانش آموزان پرداخته است که بیشتر مربوط به دانش آموزان متوسطه دوم با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی بالغین، دانشجویان و بزرگسالان است. یکی از دلایل آن عدم وجود ابزار گردآوری داده تا برای نوجوانان و دانش آموزان سنین متوجه اول بر اساس سازه های نظریه

سبک زندگی سالم تأثیر به سزاای بر سلامت جسمی و روانی فرد، جامعه و درنهایت بهبود کیفیت زندگی افراد دارد (۲۰) به مطالعه سبک زندگی و رفتارهای ارتقای سلامت در جهان توجه خاصی شده است، بیشتر مطالعات در این زمینه در افراد

### بحث

سازه‌های نگرش (۰/۷۳)، هنجارهای ذهنی (۰/۹۳)، کنترل رفتاری درک شده (۰/۸۷)، قصد رفتاری (۰/۸۹) و رفتار (۰/۷۰) نشان می‌دهد. نتایج مطالعه لاوتن<sup>۸</sup> و همکاران (۲۵) مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای سازه‌های نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری به ترتیب (۰/۸۴)، (۰/۷۶)، (۰/۶۴) و (۰/۹۶) نشان می‌دهد. در توجیه بالا بودن ضریب آلفای کرونباخ بعضی از این مطالعات با مطالعه حاضر می‌توان به ماهیت متفاوت نمونه‌های پژوهش و سطح تحصیلات افراد اشاره نمود. عدم ورود به کلاس درس جهت تکمیل پرسشنامه بدون کسب اجازه از حراست آموزش‌پرورش رفستجان توسط مدیر مدرسه از موانعی بود که در تکمیل پرسشنامه وجود داشت و استقبال دانش آموزان در تکمیل پرسشنامه و پرسیدن برای راهنمایی سوالات و کلمات نامفهوم آن از نقاط قوت بود.

**نتیجه گیری:** با توجه به اهمیت بالای رفتارهای سبک زندگی و عدم وجود ابزار استاندارد سبک زندگی بر اساس تئوری‌های آموزش بهداشت در دانش آموزان نوجوان، پیشنهاد می‌گردد، این ابزار جهت تعیین عوامل مؤثر بر رفتارهای سبک زندگی نوجوانان مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در برنامه توصیفی یا مداخله‌ای با همکاری آموزش‌پرورش در سایر گروه‌های دانش آموزی مورد استفاده قرار گیرد.

### تشکر و قدردانی

مراتب سپاس و قدردانی را از دانش آموزان و معلمان مدارس شهید و جدّانی، شهید بهشتی، اقبال لاهوری و شهید عباس پور، مسئول بهداشت مدارس و حراست آموزش‌پرورش رفستجان و اعضای هیئت‌علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رفستجان را دارم. این مقاله بخشی از پایان‌نامه طرح تحقیقاتی با کد اخلاق IR.RUMS.REC.13960136 می‌باشد

### تعارض و موقع

هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسنده‌گان بیان نشده است.

رفتار برنامه‌ریزی شده می‌باشد. هدف پژوهش حاضر طراحی پرسشنامه سبک زندگی دانش آموزان متوسطه اول بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده و بررسی روایی و پایایی آن بود.

به منظور تعیین روایی صوری علاوه بر تعیین کیفی از روش کمی ضریب تأثیر استفاده شد. بررسی نسبت روایی محتوا، بر اساس روش لاوشه صورت گرفت. از مجموع ۶۶ گویه پرسشنامه طراحی شده، ۶۴ گویه آن مورد پذیرش واقع شد. از جمله تغییرات انجام شده می‌توان به حذف سؤال ۴ در مقیاس نگرش، حذف سؤال ۶ در مقیاس کنترل رفتاری درک شده اشاره نمود. سایر گویه‌ها از شاخص روایی خوبی برخوردار بوده و سادگی، وضوح و روشنی عبارات را همتاپید شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده پرسشنامه سبک زندگی که در این پژوهش طراحی شده، دارای ضریب تأثیر بالای ۱/۵ نسبت روایی بالای ۰/۶۲ و شاخص روایی بالای ۰/۷۹ بود. نتایج مطالعه پیمان و همکاران (۲۲) که از دو شاخص نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و همچنین نظر از متخصصان آموزش بهداشت برای ضرورت گویه تا استفاده کرده بودند، نشان می‌دهد شاخص نسبت روایی محتوا از ۶۲٪ بالاتر بود. نتایج مطالعه سهرابی و همکاران (۲۳) در مورد روان‌سنجی نگرش دانشجویان جهت تعیین اعتبار محتوا ابزار گردآوری داده تا بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، از روش‌های نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده نمودند که نمره نسبت روایی بالای ۰/۶۲ و نمره شاخص روایی محتوا بالای ۰/۷۰ بود که با یافته‌های مطالعه حاضر همخوانی دارد.

برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌های به دست آمده برای سازه‌های آگاهی (۰/۷۰)، نگرش (۰/۷۳)، هنجارهای انتزاعی (۰/۷۴)، کنترل رفتار درک شده (۰/۸۵) و قصد رفتاری (۰/۸۵) و رفتار (۰/۷۰) تعیین شد و این ضریب با حد قابل قبول سایر مطالعات هم‌خوانی دارد. نتایج مطالعه باجی و همکاران (۲۴) مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای سازه‌های نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری به ترتیب (۰/۸۶)، (۰/۸۳)، (۰/۶۳) و (۰/۷۴) نشان می‌دهد. همچنین نتایج مطالعه محمدی منش و همکاران (۱۳) مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای

<sup>8</sup> Lawton

## References

- 1.Moeini Ba, Dashti S, Teimori T, Halami V, Abbas Mousali A, Sharifi M, Akbarzadeh M, et, al. Health promotion behaviors on high school students'. Journal of Science2016;13(3):49-50. (In Persian)
2. Movlaefard A, Haqiqizadeh M, Mohamadyan M. Effectiveness of Information Model, Motivation and Behavioral Skills on Improving Student's Healthy Lifestyle High school Journal of School of Public Health and Health Services, 2018, 16 (1): 19- 20. (In Persian)
- 3.Eftekhargardebili H, Rahimisaleami I, Barakati H, BabaeiHeidarabadi A, Ashrafi Hafez A, Omrani A. Study of the relationship between lifestyle and cardiac ischemia. Journal of Midwifery Faculty, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences &Health Services2013; 23(81):48-50. (In Persian)
4. Piri N, Garmaroudi GH, Nouri K, Azadbakht M. Health Promoting Behaviors of First and Second High School Girls Poldokhtar. Journal of Lorestan University of Medical Sciences;2015; 17(3): 48- 50. (In Persian)
- 5.Nilazaz M, Tavassoli E, Mazaheri M, Sohrabi F, Khazali M, Ghazanfari Z, et al. A Study of Health Promoting Behaviors and Lifestyle on Dezful University Students; Journal of Ilam University of Medical Sciences;2013; 23(4):3-5. (In Persian)
- 6.Mahmoudi SA, Saraji M,Jafaripour H, Tavan H, Shamsi M, Islamic lifestyle on nutrition. Islam and Health, 2015, 2(2):72- 73. (In Persian)
7. Merkarimi K, Baqri D, Honarvar M, Kabir M, Ozonidoji R, Abri M. Factors Affecting Fast Food in High School Students Based on Theory of Planned Behavior. Journal of Gorgan University of Medical Sciences,2017, 18(4):88- 89. (In Persian)
8. Kaldi A, Kabiran Aindin H, The Relationship Between Health Promoting Lifestyle and Quality of Life Case Study: Students of Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. journal of iranian social development student, 2014; 6(4):87-92. (In Persian)
- 9.Tamouri P, Falahi A, Esmailnasab N. Application of Health Promotion Model in Studying the Physical Activity of Students in Sanandaj. Journal of School of Public Health and Institute of Health Research, 2010, 9 (1): 35- 37. (In Persian)
10. Yusufond M, Khorsandi M, N Roozbehani N, Ranjbaran M. Affecting Factors Fear of Childbirth Based on the Theory of Planned Behavior in Pregnant Women on Aleshstar. Scientific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty, 2017,25 (4): 114-120. (In Persian).
11. Karimi T; Safari M, Sanaa nasab H, khalagi K, Hassan abadi M, The impact of education based on the planned behavior on lifestyle change of patients with myocardial infection" iran Journal health educ health promot winter 2016, 3(16):371- 377. (In Persian)
- 12.Shirzad M, Solhi M. Situation of fruits and vegetables consumption in the dormitory female students based on the theory of planned behavior. Health Literacy Quarterly 2015; 1(2):131. (In Persian)
13. Sharma M, Romas JA. Theoretical foundations of health education and health promotion. 2st ed. USA: Jones and Bartlet publishers; 2008.
- 14.Alami A, Rezaetan M.h, Moshki M. Application of Planned Behavior Theory in predicting tobacco control intent and behavior Among students of Gonabad. University of Medical Sciences Iran J Health Educ Health Promot. 2016;3(4): 340- 342. (In Persian)
- 15.Bashirian S, Heidarnia AL, VerdiPour H, Hajizadeh E. The Application of Theory of Planned Behavior Based on the Scenarios of EffectiveFactors on Substance Abuse in Adolescents. Journal of Fasa University of Medical Sciences;2012; 2(3): 158. (In Persian)
16. Ghaffari M,Niknamami Sh, Kazemnejad A, Mirzaei E, Ghofranipoor F, Designing Validity and Reliability of Ten Scales on HIV Prevention in Adolescents. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences,2009,11(1):38-45. (In Persian)
17. Torkashvand F, Asadpour M, Rezaeian M. Validity and Reliability of Methadone Maintenance Therapy Abstinence Orientation Scale in Iran: A Short Report. JRUMS. 2015; 14 (7):611-620. (In Persian)
- 18.Lawshe C H. A Quantitative Approach to Content Validity. Phrsnnonhlpsychoiogy,1975;28:563-575.

19. Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika* 1951; 16(3): 297-334.
20. Karimi Sh, Afkhaminia F, Talebpour Amir F. Study of Different Dimensions of Lifestyle and Some of the Factors Associated with it in Employees of Mazandaran University of Medical Sciences In 2017, *Journal of Health Research in Community*, 2018, 3(4):63-74. (In Persian)
21. Aubi E, Shadnoush M, Nazarzadeh M, Bidel Z, Ranaei A, Delpisheh A. Translation and assessment of validity and reliability of the health-promoting lifestyle questionnaire, using factor analysis. *Pejouhandeh* 2012; 17(3):114-20. (In Persian)
22. Payman N, Charoqchyan khorasani E, Moghzi M. The Effect of Education Based on Planned Behavior Theory on Snack Usage Low value in secondary schools in Chenaran city. *Razi Medical Journal*, 2017, 23(149):61- 64. (In Persian)
23. Sohrabi Z, Ghasemzadeh M, Salehi L. Psychometric Analysis Scale of Attitude toward Plagiarism Based on the Theory of Planned Behavior in the Students of Iran University of Medical Sciences. *J Med Educ Dev.* 2018; 10 (28):53-64. (In Persian)
24. Baji Z, Shakernjat Q, Tehrani M, Hajinajaf S, Jarvandi F. Factors related to the intention to perform physical activity based on the theory of planned behavior High School Girl Students in Ahvaz City. *Journal of Education and Community Health*, 2017, 4(3): 55- 57. (In Persian)
25. Momenabadi V, Mohseni M, Iranpour A, Khanjani N. Effect of Bessenfet's Educational Intervention on the Conduct of Hookah Behavior of Students Residing Dorms at Kerman University. *Medical Sciences" Journal of Health Promotion Management*, 2015, 4(3):15-17. (In Persian)
26. Lawton R, Ashley L, Dawson Sh, Waiblinger D, Conner M. Employing an extended Theory of Planned Behavior to predict breastfeeding intention, initiation, and maintenance in White British and South-Asian mothers living in Bradford. *Br J Health Psychol.* 2012; 17(4): 854-71.

## Validity and Reliability of the Healthy Lifestyle Measurement Scale of First-Level Students Based on Theory of Planned Behavior

Yahya Ahmadi(MSc); Mehdi Abdolkarimi(PhD)<sup>2</sup>; Ahmad Reza Sayadi(PhD)<sup>3</sup>; Mohammad Asadpour(PhD)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Senior Health Education Student, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Student Research Committee, rafsanjanUniversity of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

<sup>2</sup> Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

<sup>3</sup> Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

<sup>4</sup> Assistant Professor, Department of Assistant Professor,Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

### Abstract

**Introduction:** Lifestyle is important in doing healthy behaviors by students as an important part of a community has important role. Measurement tools that are used to determine the achievement of research's goals in each study need to be evaluated. The aim of this study was to determine the validity and reliability of a healthy lifestyle measurement scale for high school students based on the theory of planned behavior in Iran.

**Materials and Methods:** In this psychometric study, after conducting library studies and using research in the city of Rafsanjan, the initial questionnaire designed and it was used to determine the validity of the tool by face and content validity from the views of 10 high school students and 10 experts in Health education and epidemiology. Determining the reliability of the tool was done using Cronbach's alpha coefficient.

**Results:** In a little narrative, the coefficient of influence of all items was more than 1/5. The ratio of validity was between 0/62 and 1 and the content validity index of each section was greater than 0.79, all of which were acceptable. The reliability of the questionnaire was performed using Cronbach's alpha coefficient which was calculated for knowledge (0/74), attitude (0/70), mental norms(0/73), perceived behavioral control(0/85), behavioral intention(0/ 85) and behavioral 0/70, was estimated.

**Conclusion:** The findings showed that the lifestyle of students based on the theory of planned behavior has a useful and acceptable validity and reliability. And can be used by researchers.

**Keywords:**Life style questionnaire,Planned Behavior Theory,Students, Validity, Reliability

.

\*Corresponding Author: Mohammad Asadpour [Asadpour2011@gmail.com](mailto:Asadpour2011@gmail.com)

Mobile: +98-9131914032

Fax: +98-76-42875592

Received: 15 oct. 2018

Accepted: 15 Jan.2019

Ahmadi Y, Abdolkarimi M, Seyadi A, Asadpour M. Validity and Reliability of the Healthy Lifestyle Measurement Scale of First-Level Students Based on Theory of Planned Behavior. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2019; 6 (3):157-67.